

Số: /SYT-NVY

Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2024

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp
truyền thông, phòng, chống, xử lý,
thu dung điều trị bệnh sởi

Kính gửi:

KHẨN

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Y tế các quận, huyện;
- Các bệnh viện bộ, ngành, tư nhân trên địa bàn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi trên toàn quốc tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng tăng nhanh tại một số địa phương. Ngày 27/8/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dịch sởi, bệnh truyền nhiễm nhóm B trên địa bàn toàn thành phố. Tại thành phố Đà Nẵng, tháng 7 ghi nhận 01 ca mắc sởi, tháng 8 ghi nhận 01 ca mắc sởi, cộng dồn đến nay 03 ca mắc sởi.

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của khu vực và cả nước, tập trung nhiều người đến làm việc, học tập, du lịch và sinh sống, không loại trừ khả năng dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sởi.

Thực hiện Công văn số 5099/BYT-DP ngày 28/8/2024 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Để chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn thành phố, Sở Y tế kính đề nghị các Sở, UBND các quận, huyện quan tâm phối hợp, yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý và đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn:

a) Thực hiện công tác truyền thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh về biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi (*hướng dẫn, khuyến cáo phòng bệnh sởi đính kèm Công văn này*). Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin sởi, biện pháp phòng, chống bệnh sởi cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

b) Chủ động thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát, phát hiện sớm; khi có giáo viên, nhân viên, học sinh có dấu hiệu sốt phát ban nghi sởi, nghi ngờ/xác định mắc sởi phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở

giáo dục, thông báo ngay cho Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế trên địa bàn để giám sát, xử lý dịch kịp thời. Đối với trẻ mắc bệnh cần được nghỉ học, không để dịch bệnh lây lan.

c) Tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, hướng dẫn trẻ em vệ sinh cá nhân, hướng dẫn tiêm và tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế.

2. Kính đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp

a) Chỉ đạo rà soát, yêu cầu các nhóm trẻ gia đình, cơ sở nuôi dạy trẻ, nhóm lớp tư thục trên địa bàn các xã, phường, các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh, thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của tiêm phòng vắc xin sởi, vận động gia đình, học sinh tham gia tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi, phối hợp tổ chức tốt việc tiêm vắc xin sởi tại các cơ sở giáo dục (nếu có), đặc biệt là trong chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella. Đối với trẻ mắc bệnh cần được nghỉ học, không để dịch bệnh lây lan.

b) Chỉ đạo Phòng y tế phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sởi; khẩn trương rà soát các đối tượng trong diện tiêm phòng sởi, sởi - rubella chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để có kế hoạch tiêm vét, tiêm bù trong các đợt tiêm chủng thường xuyên hàng tháng.

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, các ngành, đoàn, thể trên địa bàn phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng (CDC, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế) giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sởi tại địa phương; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người dân phòng, chống dịch, xử lý hiệu quả khi có ca bệnh, ổ dịch.

d) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, xã phường, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trong phạm vi quản lý trên địa bàn.

đ) Tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông về biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi cho trẻ em và gia đình (hướng dẫn, khuyến cáo phòng bệnh sởi đính kèm Công văn này).

3. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; tăng cường thông tin, truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân không hoang mang, lo lắng; chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh sởi tại cộng đồng, gia đình, cơ sở giáo dục: hạn chế tập trung đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng và sử dụng khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người. Tăng cường truyền thông, tuyên truyền vận động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng nhắc lại vắc xin phòng bệnh sởi.

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

a) Chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Y tế quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp truyền thông, giám sát, phát hiện sớm, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra, xử lý, phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn thành phố.

b) Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với các địa phương lân cận và trên cả nước để chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; giám sát tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh để cách ly, điều trị, khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, đúng quy định nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

c) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi. Chỉ đạo, kiểm tra các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ 09 tháng tuổi; vắc xin sởi - rubella cho trẻ 18 tháng tuổi bảo đảm đạt tỷ lệ trên 95% quy mô xã, phường.

d) Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn đến Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn để phối hợp truyền thông hiệu quả đến người dân.

đ) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống bệnh sởi bằng nhiều hình thức.

e) Kịp thời tham mưu Sở Y tế triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan kéo dài trên địa bàn thành phố. Rà soát, quản lý, đảm bảo cung cấp đầy đủ các điều kiện trang thiết bị, hóa chất xử lý, phòng, chống dịch đối với các đơn vị.

5. Trung tâm Y tế các quận, huyện

a) Tăng cường tham mưu, cung cấp thông tin để chính quyền, các lực lượng địa phương triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sởi trên địa bàn; Hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp với Phòng Y tế quận, huyện và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn, nhất tại các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ gia đình, nhóm lớp tư thực, cơ sở nuôi dạy trẻ; xử lý triệt để ca đơn lẻ, các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn.

b) Tăng cường điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng trẻ từ 09 tháng tuổi đến 03 tuổi, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin sởi hoặc vắc xin sởi- rubella để tiến hành tiêm bù, tiêm vét. Đảm bảo tất cả các trẻ tiêm vắc xin sởi và vắc xin sởi-rubella phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia.

c) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết về sự cần thiết của việc tiêm chủng vắc xin sởi và vắc xin sởi-rubella, cách nhận biết và các biện pháp phòng chống bệnh sởi.

d) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nhân lực... đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời đề xuất Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ khi cần thiết.

đ) Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng. Khi phát hiện các ca bệnh nghi ngờ/mắc bệnh, thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế.

6. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế các quận, huyện

a) Chuẩn bị đầy đủ cơ sở cách ly, thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực... tổ chức tốt việc khám sàng lọc, phát hiện sớm, phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi, nghi ngờ/mắc bệnh sởi, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

b) Phân loại và điều trị đúng phát đồ; phát hiện sớm và điều trị tích cực các trường hợp diễn biến nặng, chú ý các đối tượng có bệnh nền, giảm tối đa số trường hợp biến chứng nặng và tử vong do mắc bệnh sởi. Đặc biệt lưu ý các trường hợp bệnh nặng nhập viện trong các ngày thứ 7, Chủ Nhật, ngày nghỉ, ngày lễ. Duy trì hội chẩn bằng nhiều hình thức, chuyển tuyến đúng và kịp thời, tránh tình trạng chuyển tuyến muộn, nguy cơ tử vong cao.

c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế dự phòng theo phân công giám sát trong công tác thông tin, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khử khuẩn, điều tra, giám sát, xử lý ca bệnh tại cơ sở y tế.

d) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, báo cáo đầy đủ tại hệ thống trực tuyến (phần mềm) Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế và đường link báo cáo trực tuyến bit.ly/baocaobtndieutridn của Sở Y tế.

Sở Y tế kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận huyện, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng quan tâm, phối hợp; yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Y tế xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn./.

(đính kèm Hướng dẫn, khuyến cáo phòng chống bệnh sởi)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục YTDP (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Viện Pasteur Nha Trang (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thu Tùng

HƯỚNG DẪN, KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI

(đính kèm Công văn số /SYT-NVY ngày tháng 8 năm 2024 của Sở Y tế)

I. ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA BỆNH

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra. Biểu hiện của bệnh bao gồm: sốt, phát ban và viêm long đường hô hấp, xuất hiện các hạt nhỏ màu trắng (Koplik) ở niêm mạc miệng. Bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong, bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng. Bệnh sởi rất dễ lây lan và thường gây thành dịch. Trước đây hầu hết trẻ em đều mắc sởi. Việc triển khai rộng rãi tiêm vắc xin sởi trong nhiều năm đã không chế thành công bệnh sởi.

Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp do hít phải các dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bắn ra được khuếch tán trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân. Bệnh sởi có tốc độ lây nhiễm rất cao, đặc biệt trong điều kiện sống khép kín thì hầu hết những người chưa có miễn dịch đều có thể bị mắc bệnh; miễn dịch có được sau mắc bệnh hoặc sau tiêm vắc xin bền vững; miễn dịch của mẹ truyền cho con có thể bảo vệ trẻ trong vòng 6 đến 9 tháng sau khi ra đời.

II. HƯỚNG DẪN PHÒNG BỆNH

1. Biện pháp dự phòng sởi

1.1. Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về bệnh sởi, cách nhận biết và biện pháp phòng chống.

1.2. Nâng cao sức đề kháng cơ thể bằng: ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất.

1.3. Tiêm vắc xin phòng bệnh sởi là biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất. Có thể sử dụng vắc xin dạng đơn hoặc dạng phối hợp (sởi – rubella hoặc sởi-quai bị-rubella).

Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. Đối tượng và lịch tiêm vắc xin sởi:

- Trẻ nhỏ: tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai khi trẻ 18 tháng tuổi.

- Đối tượng khác nếu chưa được tiêm vắc xin sởi trước đó cần tiêm 1 mũi.

1.4. Đối với bệnh nhân:

Cách ly và chăm sóc y tế bệnh nhân trong 7 ngày kể từ khi phát ban. Trường hợp bệnh nhẹ cho cách ly tại nhà (nghỉ học, nghỉ làm việc, không tham gia các hoạt động tập thể, tập trung đông người). Trường hợp bệnh tiến triển nặng lên hoặc có dấu hiệu biến chứng phải điều trị và cách ly tại các cơ sở y tế. Trong thời gian cách ly bệnh nhân phải đeo khẩu trang y tế.

1.5. Đối với cộng đồng:

a) Tuyên truyền tới từng hộ gia đình về bệnh sởi: cách nhận biết và các biện pháp phòng chống.

b) Tăng cường vệ sinh cá nhân

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân hàng ngày.
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
- Tránh tối đa việc chùi tay lên mắt, mũi, miệng.
- Thường xuyên vệ sinh đường mũi, họng, mắt hàng ngày bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường đặc biệt là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân (người sống cùng nhà, thầy thuốc trực tiếp chăm sóc, điều trị).

- Đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

- Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ.

c) Hạn chế tiếp xúc với người bệnh

- Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi.
- Hạn chế tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân.

- Hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt tại những phòng chật hẹp, ít thông khí ở khu vực ổ dịch.

- Không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân (khăn mặt, bàn chải, kính, cốc, chén, bát, đĩa...), đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng.

d) Khử trùng và vệ sinh thông khí

- Thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính để ánh nắng chiếu vào và đảm bảo thông khí thoáng cho nhà ở, phòng học, nơi làm việc, phòng điều trị hàng ngày.

- Thường xuyên làm sạch đồ chơi, đồ vật bị nghi ngờ ô nhiễm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch.

- Lau sàn nhà, nắm đấm cửa, mặt bàn, ghế, khu vệ sinh chung hoặc bề mặt của đồ vật nghi ngờ bị ô nhiễm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường từ 1 – 2 lần/ngày.

đ) Thông báo cho cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và biểu hiện mắc bệnh.

Người dân trong cộng đồng khi có biểu hiện mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị và hướng dẫn cách ly y tế kịp thời.

Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

2. Xử lý ổ dịch/dịch

2.1. Xử lý ổ dịch tại trường học, cơ quan, xí nghiệp

- Tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên các biện pháp phòng, chống bệnh sởi.

- Theo dõi hàng ngày tình hình sức khỏe toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên để phát hiện bệnh nhân mắc mới cho đến khi ổ dịch chấm dứt. Thực hiện báo cáo ổ dịch/dịch theo đúng quy định.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, phải nghỉ học, nghỉ làm việc và cách ly y tế 7 ngày kể từ ngày phát ban.

- Khử trùng bề mặt toàn bộ lớp học, nơi làm việc, nơi ở, bếp ăn tập thể có trường hợp bệnh bằng lau sàn nhà, bàn ghế, nắm đấm cửa, vật dụng đồ chơi, khu vệ sinh chung bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc dung dịch khử trùng có chứa Clo với nồng độ 0,5% Clo hoạt tính.

- Tăng cường thông khí, ánh sáng tự nhiên lớp học, nơi làm việc bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào.

- Lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định.

2.2. Xử lý ổ dịch tại cộng đồng

- Tuyên truyền cho cộng đồng các biện pháp phòng, chống bệnh sởi.

- Giám sát, điều tra dịch tễ các trường hợp mắc tại khu vực ổ dịch, phân tích và thực hiện báo cáo khẩn cấp lên cơ quan y tế cấp trên. Thực hiện theo dõi và báo cáo diễn biến bệnh/ dịch hàng ngày theo quy định.

- Người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, phải nghỉ học, nghỉ làm việc và cách ly y tế 7 ngày kể từ ngày phát ban.

- Khử trùng bề mặt tại nhà bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh: sàn nhà, vật dụng, bàn ghế, nắm đấm cửa, đồ chơi, khu vệ sinh chung bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc dung dịch khử trùng có chứa Clo với nồng độ 0,5% Clo hoạt tính. Phạm vi các hộ gia đình xung quanh cần được xử lý do cán bộ y tế quyết định.

- Tăng cường thông khí, ánh sáng tự nhiên nhà ở bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào.

- Lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định ở mục 3 phần II.

2.3. Triển khai tiêm vắc xin chống dịch sởi

Việc quyết định **tiêm vắc xin chống dịch** cần dựa trên tình hình thực tế ổ dịch/dịch để xác định phạm vi và đối tượng tiêm vắc xin theo sự hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur và Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia.

daopla-30/08/2024 16:19:35-daopla-daopla-daopla